



## Flujograma COVID-19 Comité de Control de Infecciones

### Definición de caso:

**Fiebre y uno o más síntomas respiratorios:** Tos - Odinofagia - Dificultad respiratoria

Historia de viaje en los últimos 14 días o residencia en China, Corea Del Sur, Japón, Irán, Europa, Estados Unidos, Chile, Brasil o contacto con paciente con diagnóstico probable o confirmado de COVID-19

Personal administrativo y/o enfermero de consultorio de febril respiratorio interroga al paciente

- ¿Tuvo fiebre?
- ¿Tos? ¿Dolor de garganta?
- ¿Fatiga/Dificultad para respirar?
- ¿Proviene de un destino o estuvo en contacto con caso confirmado o probable de coronavirus?

Si

No

Paciente en sala de espera para su atención

-Se da aviso al personal de salud de **consultorio de febriles respiratorios**  
-Ingreso de paciente con barbijo quirúrgico a la sala de aislamiento en **consultorio de febriles respiratorios**.

Personal que tenga intervención con el paciente debe hacerlo con EPP:

Ingreso a la habitación con EPP

- Barbijo quirúrgico
- Camisolín
- Guantes
- Cofia
- Protección ocular

Descarte de EPP dentro de la habitación en bolsa roja y caja para residuos patogénicos

Fuera de la habitación lavarse las manos durante 60 segundos con agua y jabón (según OMS)

Barbijo M95 uso **exclusivo** para personal de salud que realice procedimientos invasivos que pueden provocar aerosolización: intubación, hisopado NF más OF, toma de muestra respiratorias, aspiración de secreciones.

- Evitar el desplazamiento del paciente dentro del hospital
- Medidas de desinfección de superficies con EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

- Realizar internación
- Llenado de 2 (dos) fichas epidemiológicas
- Toma de muestra:
  - ✓ hisopado nasofaríngeo y orofaríngeo
  - ✓ Esputo
  - ✓ Aspirado traqueal (opcional)
  - ✓ BAL (opcional)
- Laboratorio: prácticas seguras de extracción de sangre
- RX de Tórax con equipo portátil

- ✓ Traslado del paciente a sala de internación designada con barbijo quirúrgico previo aviso a médico de piso.
- ✓ Personal de salud encargado del traslado con EPP

- **Paciente en sala de internación.**
- Médico con EPP realiza historia clínica de piso.
- Retiro de EPP dentro de la habitación en bolsa roja y caja para residuos patogénicos
- Lavado de manos fuera de la habitación durante 60 segundos (recomendación según OMS)

**El aislamiento recomendado es de contacto y transmisión por gota**

Recomendaciones que se modifican acorde a la situación epidemiológica